



Dawkowanie **IMPACT POWDER – BYDŁO – Do stosowania ciągłego**

Krowy mleczne:

Ułatwia przyswajanie witamin i minerałów. Usprawnia trawienie w jelitach oraz poprawia wykorzystanie białka, wpływa na obniżenie poziomu komórek somatycznych i stanów zapalnych. Zapobiegawczo i leczniczo przeciwko biegunce, wiąże mykotoksyny i inne patogeny, działa oczyszczająco na organizm zwierzęcia, ułatwia pracę narządów wewnętrznych, głównie przewodu pokarmowego i wątroby. Stabilizuje pracę żwacza.

Dawka w diecie ustabilizowanej:

- średnio 120 g/sztuka dziennie – ok. 0,5 % na 24 kg suchej masy dobowej dawki pokarmowej w tmr.

W wypadku biegunki dawka podwójna przez 1-2 dni, następnie średnio 120 g/sztuka dziennie.

Nie stosować w okresie zasuszania.

Wprowadzić do tmr na 2-3 tygodnie przed wydzieleniem, przygotowując krowę do laktacji.

Zalecenie żywienia, wskazania ogólne:

- zielonka/kiszonka jako baza
- dostateczna ilość produktów do przeżuwania
- **Impact Powder** (związki mineralne z węglem)
- białko surowe - 14 do 15% (max.) – należy kontrolować poziom mocznika w mleku !
- odpowiednia energia, dawka dobrana do wydajności, premix witaminowy.

Nie jest wymagane stosowanie buforów, żywych kultur drożdży (metabolity drożdży i drożdże paszowe mogą pozostać w dawce), **dodatkowych antymykotoksykantów.**

Mocznik syntetyczny nie może być stosowany w dawce ciągłej z Impact Powder.

Impact Powder nie zastępuje premixów witaminowych.

Cielęta:

Powoduje szybszy przyrost i lepsze wykorzystanie paszy, zwiększona odporność (zwiększona zawartość β i γ immunoglobulin we krwi), zwiększona liczba czerwonych ciałek we krwi i wyższa zawartość hemoglobiny, zmniejszona liczba białych ciałek (redukuje stany zapalne). Zapobiegawczo i leczniczo przeciwko biegunce. Odchów bez antybiotyków.

W pierwszym tygodniu dawka 10 g/sztuka dziennie (czubata łyżeczka od herbaty).

Od 2 tygodnia

Dawka 10-15 g/na sztukę dziennie dodana do pójła lub w formie pasty bezpośrednio do pyska.

Od 2 m-ca.

Dawka 15-20 g/na sztukę dziennie najlepiej do pójła.

Od 5-mca – 30 g/sztuka. Dalej proporcjonalnie do wagi.

Dalej zgodnie z zależnością $dawka [g] = mc [kg]/5$

Przy biegunce dawka podwójna – jednorazowo.

Bydło opasowe : ok. 0,5 % w s.m. dobowej dawki pokarmowej.

- 50 g na 10 kg suchej masy dawki.