



Dawkowanie **IMPACT POWDER - drób**

Działanie: Ułatwia przyswajanie witamin i minerałów, usprawnia trawienie w jelitach oraz poprawia wykorzystanie paszy zwłaszcza białka, zapobiegawczo i leczniczo przeciwko biegunce, wiąże mykotoksyny i inne patogeny, działa oczyszczająco na organizm drobiu, ułatwia pracę narządów wewnętrznych, głównie przewodu pokarmowego i wątroby, obniża emisję amoniaku i osusza ściółkę, wykazuje działanie bakteriostatyczne, poprawia kondycję ptaków, poprawia parametry skorupy jaja i zwiększa nieśność, redukuje stres.

Brojler

Stosowanie stałe

Starter – 0,2 %

Grower – 0,3 %

Finisz – 0,4 %

Doraźnie przy biegunkach dawka - 0,5 – 0,6 %. Działanie hamujące do 48 godzin.

Nioska

W okresie odchowu kurek dawki jak dla brojlera: 0,2 – 0,4 %

W okresie nieśnym – 0,5 %.

Indyk rzeźny, gęsi, kaczki

Starter – 0,3 %

Grower – 0,4 %

Finisz – 0,5 %

Uwaga:

Wprowadzając preparat do stałej diety należy uwzględnić lepsze wykorzystanie paszy.

Podczas stosowania **IMPACTu** nie ma potrzeby stosować dodatkowych antymykotoksykantów .